

Euphorbium compositum SN  
Euphorbium D3 + ASSOCIAÇÃO

**Medicamento Antihomotóxico.**

#### **FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**

Solução gotas – Frasco com 30 ml – 18 gotas/ml.

#### **VIA ORAL**

#### **OUTRAS FORMAS FARMACÊUTICAS, VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES**

Spray Nasal – Via tópica – Frasco com 20 ml.

#### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

#### **COMPOSIÇÃO**

30 ml contêm: 286,6 mg de Euphorbium D3; 286,6 mg de Pulsatilla pratensis D2; 286,6 mg de Luffa operculata D6; 286,6 mg de Hydrargyrum biiodatum D8; 286,6 mg de Hepar sulfuris D10 e 286,6 mg de Argentum nitricum D10, em solução alcoólica 35% (vol.).

#### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

##### **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Euphorbium compositum SN solução é indicado como auxiliar no tratamento da sinusite aguda e crônica, com inflamação do sinus maxilar, sinus frontal, sinus etimoidal e sinus esfenóide, catarro nas passagens auditivas e hidropisia do ouvido médio.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

##### **COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

A aplicação do medicamento antihomotóxico atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as toxinas produzidas pelo organismo, ou ingeridas, ou inaladas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível o equilíbrio biológico. Este novo conceito de tratamento nasceu na terapêutica homeopática a qual está embasada no princípio da similitude, na lei de cura e na patogenesia das substâncias medicamentosas descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas, bem como, nos conceitos da imunologia. O medicamento antihomotóxico Euphorbium compositum SN auxilia o tratamento de sinusite aguda e crônica, em particular na forma seca (atrofia da mucosa nasal).

##### **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento não deve ser utilizado sem acompanhamento médico em caso de distúrbio da tiróide.

Este medicamento é contra-indicado às pessoas com alergia aos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.**

##### **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento contém ÁLCOOL. Em virtude do teor alcoólico, Euphorbium compositum SN deve ser administrado nos casos de doenças hepáticas e alcoolismo somente com acompanhamento médico.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento, antes do início, ou durante o tratamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

##### **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve guardar este medicamento, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

Este medicamento tem validade de 24 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

Euphorbium compositum SN é uma solução límpida, incolor a levemente amarelada, com odor e sabor alcoólico.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o farmacêutico para saber se você poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

## COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é de uso oral. Você deve tomar Euphorbium compositum SN solução oral com um pouco de água.

Para o uso correto do medicamento, siga corretamente a orientação abaixo, ou a prescrição do seu médico.

**Adultos:** Em geral, tomar 10 gotas, 3 vezes ao dia. Nos casos agudos, iniciar com 10 gotas a cada 15 minutos e reduzir para 10 gotas 6 vezes ao dia, ou de acordo com a prescrição do seu médico.

**Crianças:** a dosagem pediátrica deve seguir a tabela abaixo

Grupo etário	Dosagem normal	Dosagem aguda
Crianças de 1 – 6 anos	5 gotas com um pouco de água, 3 vezes ao dia.	Ingerir com um pouco de água 5 gotas a cada meia hora ou uma hora, até 12 vezes ao dia.
Crianças de 6 – 12 anos	7 gotas com um pouco de água, 3 vezes ao dia.	Ingerir com um pouco de água 7 gotas a cada meia hora ou uma hora, até 12 vezes ao dia.
Adolescentes acima de 12 anos	Dosagem de adulto	Dosagem de adulto

Mantenha o frasco sempre fechado após o uso.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos, pois pode significar uma reação ao medicamento, que pode requerer uma nova orientação do prescritor.**

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor ou o modo de tomar sugerido nesta bula. Use o medicamento dentro do prazo de validade.

## O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça-se de tomar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

## QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Este medicamento contém algumas substâncias em baixas dinâmizações e, portanto, algumas reações indesejáveis podem ocorrer.

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

**O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjôo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e procure o seu médico ou o farmacêutico.

Contribua com o tratamento: relate ao prescritor todos os tratamentos que você já fez ou está fazendo. Atenda às sugestões do prescritor, para que seu tratamento seja eficaz.

Não observando o resultado esperado, consulte o prescritor ou farmacêutico.

Não se automedique, pode ser prejudicial à sua saúde e dificultar o diagnóstico correto do médico.

Lote, data de validade e data de fabricação: vide frasco e cartucho.

MS: 1.6198.0008.002-1

Farmacêutico responsável: Wilton Adão - CRF-PR 30.165

Produzido por: Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 – Baden-Baden, Alemanha.

Importado e distribuído por:

**Heel do Brasil Biomédica Ltda.**

Avenida Santos Dumont, 1100 3º andar

83403-500 – Colombo – PR

CNPJ: 05.994.539/0001-27

SAC: 0800-7709000

www.heel.com.br

**- Heel**

